

잎집무늬마름병에 대한 완벽한 디펜스



# 울타리

액상수화제



벼 잎집무늬마름병



벼 이삭누룩병

품목명 : 펜사이큐론 · 테부코나졸 액상수화제 유효성분 : Pencycuron 20% + Tebuconazole 4% 계통 : 페닐우레아계(N4) + 트리아졸계(사) 독성 : 저독성, 어독성 III급 포장단위 : 1ℓ

### 「울타리」 액상수화제 특징

- 1** 두 가지 성분의 조합 병해에 대한 예방 및 치료 효과 우수

식물체 표면에 보호막 형성이 탁월한 펜사이큐론과 우수한 침투이행성 약제인 테부코나졸의 합제로 예방과 치료효과를 동시에 발휘합니다.
- 2** 잎집무늬마름병에 탁월한 효과

최근 문제시 되는 잎집무늬마름병에 긴 약효지속성을 가집니다.
- 3** 다양한 병해에 대한 우수한 효과

잎집무늬마름병, 이삭누룩병, 잘록병 등 다양한 병해에 사용이 가능한 전문약제입니다.
- 4** 저항성 병원균에 대한 우수한 약효

다른 약제의 내성균에도 효과가 우수합니다.

### 적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a) 당 사용량		안전사용기준	
				약량	살포량	사용시기	사용횟수
벼	이삭누룩병	출수 7일전부터 7일간격 경엽처리	10mℓ	약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림		수확 40일전	2회 이내
	잎집무늬마름병	유수형성기 및 수잉기 경엽처리					
	잎집무늬마름병 (무인항공기)		-	50mℓ	0.8ℓ(16배)		
인삼	잘록병	발병초 7일간격 토양관주처리	10mℓ	500mℓ	1,000ℓ(1ℓ/㎡)	수확 21일전	3회 이내
잔디	라이족토니아마름병					-	-



사용 방법

1. 이 농약은 병무늬가 나타나는 초기부터 살포하여 주십시오.
2. 이 농약은 액상수화제이므로 잘 흔들어 사용하십시오.



주의 사항

1. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
2. 신체에 이상(감기, 알레르기, 천식, 피부병 등)이 있는 사람이나 임산부는 약제 살포 및 취급을 금합니다.
3. 이 농약은 영하 5도(°C) 이하에서는 얼 우려가 있으므로 보관장소의 온도가 영하 5도(°C) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.
4. 이 농약은 눈을 자극시킬 수 있으므로 방제복, 마스크 등 방제장비를 반드시 착용하십시오.