

2가지 성분으로 벼 앞집무늬마름병·잔디 라이족토니아마름병을 확실하게!



벼 앞집무늬마름병



잔디 라이족토니아마름병

함초롱

액상수화제

품목명 : 헥사코나졸 · 펜사이큐론 액상수화제 유효성분 : Hexaconazole 2% + Pencycuron 15% 계통 : 트리아졸계(사) + 페닐우레아계(나4) 독성 : 저독성, 아독성 III급 포장단위 : 250ml, 1ℓ

「함초롱」액상수화제 특징

- 1 **두 가지 성분의 강력한 혼합제**
 벼 앞집무늬마름병 방제 전문약제인 헥사코나졸과 펜사이큐론의 혼합제로 강력한 약효를 나타냅니다.
- 2 **강력한 침투이행성 및 뛰어난 예방/치료 효과**
 침투이행성이 강한 약제로 작물체내로 신속하게 흡수이행되며, 예방 및 치료효과가 뛰어나 약효가 오랫동안 지속됩니다.
- 3 **뛰어난 작물 안전성**
 벼의 전 생육기에 사용가능하며, 타 약제와의 혼용성도 우수합니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량		안전사용기준	
				약량	살포량	사용시기	사용횟수
벼	앞집무늬마름병	유수형성기 및 수잉기 경엽처리	10ml	70~80ml	140~160ml	수확 30일전	2회 이내
	앞집무늬마름병(ULV)		606ml	91ml	3ℓ		3회 이내
들깨(잎)	녹병	발병초기 10일간격 경엽처리	10ml	약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림		수확 3일전	2회 이내
잔디	동전마름병	발병초 10일간격 관주처리	10ml	500ml	1,000ℓ (1ℓ/㎡)	-	-
	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 토양관주처리					
콩	탄저병	발병초기 10일간격 경엽처리		약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림		수확 21일전	3회 이내



- 벼 앞집무늬마름병 : 병 무늬가 나타나는 초기부터 약액이 잎집에 충분히 묻도록 살포하시고, 벼 이삭이 팬 후에 병 무늬가 뒷 잎집으로 번질 때에는 한번 더 약을 뿌리십시오.
- 잔디 라이족토니아마름병 : 발병초기 소정량을 물에 희석하여 1,000㎡당 1,000ℓ를 잔디 전면에 골고루 관주하여 주십시오.



- 사용방법을 잘 지키고 바람을 등지고 뿌리시되 사용 후 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
- 겨울철 빙결될 수 있으나 상온에서 한 두시간 방치 후 흔들면 풀어지며 약효에는 영향이 없습니다.