

## 치료효과가 탁월한 세균병 전문약제

## 농용신

수화제



복숭아 세균구멍병



배추 무름병

품목명 : 스트렙토마이신 수화제 유효성분 : Streptomycin 20% 계통 : 항생제(라4) 독성 : 저독성, 어독성 III 급 포장단위 : 500g

## 「농용신」 수화제 특징

- ① 효과적인 세균성 병해 방제
- ② 강력한 세균번식 억제효과

고농도 농업용 항생제로 세균성 병해를 효과적으로 방제할 수 있습니다.

침투이행성이 우수하며, 약효가 빠르게 나타나 각종 세균 번식을 강력히 억제합니다.

## 적용병해충 및 사용량

| 작물명        | 적용병해    | 사용시기 및 방법                                                      | 물 20ℓ 당<br>사용약량 | 안전사용기준    |       |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
|            |         |                                                                |                 | 사용시기      | 사용횟수  |
| 감귤         | 궤양병     | 봄철 : 새 잎이 굳기 조금전(5월 하순)부터 경엽처리<br>여름철 : 여름순이 굳기전(7월 상순)부터 경엽처리 | 20g             | 수확 21일전   | 5회 이내 |
| 감초         | 세균점무늬병  | 발병초 7일간격 경엽처리                                                  |                 |           | 3회 이내 |
| 나디아        | 검은점무늬병  | 발생초기 경엽처리                                                      | 25g             | 수확 14일전   | 2회 이내 |
| 당근         | 무름병     |                                                                |                 |           | 1회 이내 |
| 대추         | 세균열매썩음병 | 발병초 7일간격 경엽처리                                                  | 20g             | 수확 21일전   | 3회 이내 |
| 레몬(라임)     | 궤양병     |                                                                |                 |           |       |
| 매실         | 검은점무늬병  | 발생초기 경엽처리                                                      | 25g             | 수확 7일전    | 3회 이내 |
|            | 궤양병     | 낙화직후 10일간격 경엽처리                                                | 20g             | 수확 21일전   | 1회 이내 |
| 방울다다기양배추   | 무름병     | 발병초 7일간격 경엽처리                                                  | 10g             | 만개 후 15일전 | 2회 이내 |
| 배          | 화상병     | 만개 5일 후 경엽처리                                                   |                 |           |       |
| 사과         | 무름병     | 발병초 7일간격 경엽처리                                                  | 25g             | 수확 7일전    | 4회 이내 |
| 배추         | 세균구멍병   | 꽃이 피기 직전과 꽃이 진후부터 7~10일간격 경엽처리                                 |                 | 수확 21일전   | 3회 이내 |
| 복숭아        |         | 만개 10일 후 10일간격 경엽처리                                            |                 | 수확 7일전    |       |
| 살구         | 검은점무늬병  | 발병초기 10일간격 경엽처리                                                | 20g             | 수확 14일전   | 1회 이내 |
| 순무         | 무름병     | 발생초기 경엽처리                                                      |                 | 수확 21일전   |       |
| 비트         |         | 발병초 7일간격 경엽처리                                                  |                 |           |       |
| 양배추        | 검은점무늬병  | 발생초기 경엽처리                                                      | 25g             | 수확 7일전    | 3회 이내 |
| 양앵두(체리)    | 세균구멍병   | 만개 10일 후 10일간격 경엽처리                                            |                 | 수확 3일전    | 1회 이내 |
| 자두         | 검은점무늬병  | 발병초 10일간격 경엽처리                                                 | 20g             | 수확 14일전   | 2회 이내 |
| 토마토(방울토마토) | 궤양병     | 발병초 7일간격 경엽처리                                                  |                 |           |       |
| 파(쪽파)      | 무름병     |                                                                |                 |           |       |
| 플럼코트       | 검은점무늬병  | 발생초기 경엽처리                                                      | 25g             | 수확 7일전    | 3회 이내 |
|            | 세균구멍병   | 발병직전 10일간격 경엽처리                                                |                 |           |       |
| 향미나리(파슬리)  | 무름병     | 발생초기 경엽처리                                                      | 20g             | 수확 7일전    | 2회 이내 |