

깨끗한 과원을 만드는 마술사!

드림하트

액상수화제



배 검은별무늬병



흰가루병

품목명 : 크레속심메틸 · 트리플루미졸 액상수화제 유효성분 : Kresoxim-methyl 20% + Triflumizole 15% 계통 : 스트로빌루린계(다3) + 트리azole계(사)
독성 : 저독성, 어독성 II급 포장단위 : 100mL, 250mL

「드림하트」 액상수화제 특징

- 1 낙화 후 배 흑성·적성병, 사과 탄저병 전문약**
낙화 후 약제 처리 시 배 흑성병/적성병, 사과 탄저병을 효과적으로 방제할 수 있습니다.
- 2 시설재배 작물 흰가루병 전문약**
딸기, 오이, 참외 등 시설재배작물에 발생하는 흰가루병에 효과가 탁월하며, 내성을 나타내는 흰가루병에도 우수한 효과를 나타냅니다.
- 3 강한 내우성 및 긴 약효 지속기간**
내우성 및 부착성이 매우 우수하여 약제 살포시기를 맞추기 어려운 장마기에도 우수한 효과를 발휘합니다.
- 4 뛰어난 치료 및 예방효과**
서로 다른 두가지 성분의 합제로 병 발생 전 부터 발생 후 까지 방제시기가 넓고, 강한 침투이행성이 있어 치료 및 예방효과를 나타냅니다.
- 5 병원균의 전 생활사에 작용**
병원균의 전 생활사에 작용하여 어느 시기에 살포하더라도 우수한 방제효과가 있으며 포자형성을 저해하여 2차 감염을 막아줍니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	흰가루병	발생초기 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 3일전	3회 이내
감(단감)	둥근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	13.3mℓ		
감귤	더덩이병	춘지발생초 15일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	
	검은점무늬병	6월 상순부터 14일간격 경엽처리			
딸기	흰가루병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 5일전	2회 이내
매실		발생초기 경엽처리		수확 30일전	3회 이내
배	검은별무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일전	4회 이내
	붉은별무늬병				
복숭아	잣빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일전	3회 이내
사과	점무늬낙엽병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일전	4회 이내
	겉무늬썩음병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리			
	탄저병				
수박(복수박)	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일전	3회 이내
오이				수확 2일전	
오미자		발생초기 경엽처리		수확 14일전	
자두	잣빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일전	2회 이내
참나물(파드득나물)	점무늬병	발생초기 경엽처리		수확 14일전	
참외	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리	수확 2일전	3회 이내	
	노균병	발병초 7일간격 경엽처리			
포도			발병초 10일간격 경엽처리	수확 14일전	

「드림하트」 액상수화제 방제효과

[2014년 (주)한일싸이언스 부설연구소]


참외 흰가루병



「드림하트」



무처리




배 검은별무늬병




「드림하트」



대조약제



무처리



배 붉은별무늬병




「드림하트」



대조약제



무처리




사과 탄저병



「드림하트」



무처리



주의
사항

1. 하우스 내 고온다습한 조건에서는 어린잎에 약해가 발생할 수 있으니 처리 후 반드시 환기를 시키시고, 전착제 및 침달성이 높은 영양제와의 혼용은 약해가 발생할 수 있으니 혼용하지 마십시오.
2. 배의 개화시부터 초기 신엽전개기에는 약해 발생의 우려가 있으므로 사용에 주의하십시오.
3. 파라핀 오일과 혼용할 경우 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.