

예방 및 치료효과가 탁월한 광범위 종합살균제

티포라탄

분산성액제



고추 탄저병



감귤 더듬이병

품목명 : 테부코나졸 분산성액제 유효성분 : Tebuconazole 12% 계통 : 트리아졸계(사) 독성 : 저독성, 어독성 II급 포장단위 : 20mL, 200mL, 500mL

「티포라탄」 분산성액제 특징

- ① 직접살균에 의한 확실한 효과
강한 침투이행으로 약효가 지속되어 잎, 어린열매에 침입하는 병원균에 대한 살균 효과가 우수합니다.
- ② 내성 병원균에 강력한 살균효과
다른 계통약제에 의한 저항성균에도 효과가 우수합니다.
- ③ 광범위한 종합살균제
과수류, 과채류, 잔디 등 다양한 작물에 동시방제 가능한 뛰어난 약제입니다.
- ④ 장마기 이후에 효과 탁월
생육 초기~후기까지 발생하는 병원균을 방제할 수 있습니다.
- ⑤ 환경 친화적 안전한 약제
조류, 토양생물, 꿀벌 등 주변 생태계에 안전한 약제입니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감)	탄저병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	20mℓ	수확 21일전	4회 이내
감귤	더듬이병	춘지 발생초 15일간격 경엽처리		수확 30일전	3회 이내
고추(단고추류)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 3일전	
마늘	잎마름병			수확 14일전	
배	검은별무늬병			수확 21일전	4회 이내
복숭아	탄저병		수확 14일전	3회 이내	
사과		6월 상순부터 10일간격 경엽처리	40mℓ	수확 30일전	
수박(복수박)		발병초 10일간격 경엽처리	20mℓ	수확 7일전	4회 이내
잔디	라이족토니아마름병	발생초 7일간격 토양 관주처리	20mℓ(1ℓ/m²)	—	—
파	녹병	발병초 10일간격 경엽처리	20mℓ	수확 14일전	3회 이내
포도	탄저병			수확 21일전	

「티포라탄」 분산성액제 방제효과

[시험년도 : 2005년]

