


깨끗한 잔디를 위한 현명한 선택!

굿초이스

입상수화제



동전마름병



라이족토니아마름병

품목명 : 아зок시스트로빈 · 테부코나졸 입상수화제 유효성분 : Azoxystrobin 25% + Tebuconazole 50% 계통 : 스트로빌루린계(다3) + 트리azole계(사1)
독성 : 저독성, 어독성 III급 포장단위 : 250g

「굿초이스」 입상수화제 특징

뛰어난 예방효과 및
확실한 치료효과

두가지 성분의 합제로 포자발아 억제, 군사 생육저지 및 포자형성 저해작용 등 예방 및 치료효과를 동시에 가지고 있어 경제적인 방제를 할 수 있습니다.

탁월한 침투이행성

약제 침투성이 탁월하며, 내우성이 우수합니다.

긴 약효 지속성

약효 지속성이 길어 안정적인 약효를 나타냅니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	안전사용기준	
					사용시기	사용횟수
고추(단고추류)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	4g	약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림	수확 3일전	3회 이내
잔디	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 경엽처리			1,000ℓ(1ℓ/㎡)	-
		발병초 7일간격 토양관주처리				
	갈색잎마름병	발병초 7일간격 관주처리				
	여름잎마름병(썸머패취)	발병직전(5월 중순경)부터 14일간격 관주처리				
	동전마름병	발병초 10일간격 관주처리	5g			
	피티움마름병	발병초 7일간격 토양관주처리	4g			

잔디 주요 병해

동전마름병



- 우리나라는 주로 그린에서만 문제
- 늦은 봄~늦은 가을까지 발생(15~30℃)
- 토양이 건조하고 상대습도가 높은 환경
- 4월 하순 산발적 발생,
6월 중순~7월 중순 전면적 발생
- 8월 하순~9월 상순 재발생
(10월 중, 하순까지 지속)

라이족토니아마름병



- 5월초부터 발병(15~30℃, 상대습도 90%)
- 6월 하순~9월 하순 다발생(장마기)
- 직경 60cm~6m에 이르기까지 다양하게 나타남
- 30℃ 이상의 고온기에서는 병원균 활력이 떨어져 발생 정지
- 한국잔디류에 발생률이 높은 반면 한지형 잔디류에는 발생이 적음

피티움마름병




- 우리나라에 최근 문제시 되는 병해
- 따뜻하고 습한 기후 조건에 발생
- 한 여름철 다발생(4~5월 일부 발생)
- 고온성 균으로 일순간 넓은 면적으로 발생
- 잠복기간이 12~24시간으로 매우 짧음

「굿초이스」 입상수화제 방제효과

· 시험기관 : (주)한얼씨아인스 부설연구소

잔디 동전마름병



잔디 라이족토니아마름병



잔디 피티움마름병



사용방법

1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 잔디에 충분히 젖도록 관주 또는 경엽처리 하십시오.
2. 이 농약은 소정약량을 물에 희석하여 잘 저어가며 사용하여야 하며, 관주할 때는 약액이 한 곳에 몰리지 않도록 하여 잔디에 골고루 묻도록 처리하십시오.

주의사항

1. 이 농약은 침투성이 빠른 약제이므로 전착제류, 침투촉진제 등과 혼용 시 약해의 우려가 있으므로 사용에 주의하십시오.