

작물에 안전한 광범위 종합살충제

강써브

수화제



파밤나방



복숭아혹진딧물

품목명 : 비펜트린 수화제 유효성분 : Bifenthrin 2% 계통 : 합성피레스로이드계 (3a) 독성 : 저독성, 어독성 I 급 포장단위 : 500g

「강써브」 수화제 특징

- ① 장기간 효과 발현
합성피레스로이드계 살충제로서 접촉독 및 소화중독에 의해 장기간 효과를 발현합니다.
- ② 넉다운(Knock-down) 효과
강력한 속효성(Knock-down)을 나타내며, 해충에 대한 기피효과가 있습니다.
- ③ 안전성과 혼용성 우수
작물에 대한 안전성과 혼용성이 우수합니다.
- ④ 독특한 작용기작
①해충의 표면에 직접 접촉시 : 접촉독이 강하여 해충의 표피를 쉽게 침투하여, 섭식시에도 살충효과가 탁월합니다.
②작물의 잎이나 줄기에 살포시 : 잔효력이 길어, 외부에서 침입한 해충에도 살충효과가 탁월합니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준			
				사용시기	사용횟수		
감귤	굴응애	엽당 2~3마리 발생시 경엽처리	20g	수확 14일전	3회 이내		
	굴녹응애	발생초기 7일간격 경엽처리					
	씩덩나무노린재						
	파리류						
강낭콩	톱다리개미허리노린재	발생초기 경엽처리		수확 7일전	2회 이내		
겨자채	배추좀나방						
고본	양배추가루진딧물	엽당 2~3마리 발생시 경엽처리				수확 7일전	2회 이내
고추냉이	배추좀나방	다발생기 경엽처리					
국화	진딧물(목화진딧물)	발생초기 경엽처리		—	—		
근대	진딧물류						
녹색꽃양배추(브로콜리)	배추좀나방	다발생기 경엽처리		수확 7일전	2회 이내		
당귀(잎/뿌리)	꼬부랑진딧물	발생초기 경엽처리					
더덕	진딧물류						
	차응애						
들깨(잎)	파밤나방				수확 3일전	2회 이내	
들깨(종실)	북쪽비단노린재	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 14일전			
땅콩	아카시아진딧물	발생초기 경엽처리		수확 7일전	2회 이내		
	파밤나방	다발생기 경엽처리					
레몬	볼록총채벌레	발생초기 경엽처리		수확 14일전	3회 이내		
레몬(라임)	톱다리개미허리노린재	다발생기 경엽처리		수확 7일전	2회 이내		
매실							
머위	진딧물류	발생초기 경엽처리				수확 14일전	
모시	애긴노린재						
무	배추좀나방	다발생기 경엽처리		수확 21일전			

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
미나리	차응애	발생초기 경엽처리	20g	수확 14일전	2회 이내	
배초향(방아)						
배추	담배거세미나방	다발생기 경엽처리		수확 7일전	3회 이내	
	배추좀나방					
	파밤나방	발생초기 경엽처리				
사과	복숭아심식나방	나방 발생 최성기인 6월 상순부터 10일간격 경엽처리		수확 14일전		3회 이내
	응애(점박이응애/사과응애)	발생초기(한잎당 2~3마리 정도 발생할 때) 경엽처리				
	진딧물 (조팝나무진딧물/사과혹진딧물)	발생초기 경엽처리	10g			
수박	진딧물 (목화진딧물/복숭아혹진딧물)			수확 3일전		
수수	노린재류	다발생기 이삭처리	20g	수확 21일전	2회 이내	
순무	배추좀나방	다발생기 경엽처리				
시금치	파밤나방	발생초기 경엽처리		수확 7일전	1회 이내	
아로니아	불록총채벌레			수확 3일전	2회 이내	
	톱다리개미허리노린재	다발생기 경엽처리				
아스파라거스	파밤나방	발생초기 경엽처리		수확 7일전		
아욱	진딧물류				1회 이내	
오렌지	불록총채벌레			수확 7일전	4회 이내	
	톱다리개미허리노린재	다발생기 경엽처리				
오이	목화바둑명나방	발생초기 경엽처리		수확 3일전	3회 이내	
완두	꽃노랑총채벌레			수확 7일전	2회 이내	
	톱다리개미허리노린재					
용과	목화진딧물	다발생기 경엽처리				
유자	불록총채벌레	발생초기 경엽처리		수확 14일전	3회 이내	
	톱다리개미허리노린재	다발생기 경엽처리				
유채	배추좀나방					
유채(잎)	유럽좁쌀바구미	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 7일전	2회 이내	
양배추	배추좀나방	다발생기 경엽처리				
장미	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리		-	-	
	짚레수염진딧물	발생초기 경엽처리				
지황	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리		수확 21일전	2회 이내	
차	간자와응애	발생초기 경엽처리		수확 14일전	3회 이내	
참깨	들깨잎말이명나방	발생초기 7일간격 경엽처리				
참나물	담배거세미나방	다발생기 경엽처리	수확 7일전	2회 이내		
참외	목화진딧물	발생초기 경엽처리		3회 이내		
천궁(일천궁)	차응애					
케일	배추좀나방	다발생기 경엽처리		2회 이내		
콩	톱다리개미허리노린재	발생초기 10일간격 경엽처리	수확 14일전	3회 이내		
토란	담배거세미나방	발생초기 경엽처리	수확 21일전	2회 이내		
포도	열점박이별잎벌레	유충성충 다발생기 경엽처리	수확 14일전	3회 이내		
홍화	우영수염진딧물	발생초기 경엽처리	수확 7일전			
파	담배거세미나방	다발생기 경엽처리			2회 이내	



- 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러 들어갈 우려가 있는 지역에서는 사용하지 마십시오.
- 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마십시오.