

깍지마기

깍지벌레약
액상수화제

- 품목명 : 아세트아미프리트 · 뷰프로페진 액상수화제
- 유효성분 : Acetamiprid 5% + Buprofezin 20%
- 계통 : 네오니코티노이드계(4a) + 치아디아진계(16)
- 독성 : 저독성, 어독성 III 급
- 포장단위 : 100mL, 250mL

깍지벌레! 최고의 수비수 「깍지마기」로 막아주세요!



특징

신경계 저해 및 탈피 억제 효과

아세트아미프리트와 뷰프로페진의 합제로 곤충의 탈피억제와 더불어 신경계 저해를 일으켜 치사시킵니다.

깍지벌레 전 생육기 방제

깍지벌레의 알(부화억제), 유충(탈피억제), 성충까지 방제 가능합니다.

우수한 침투이행성 및 침달성

우수한 침투이행성 및 침달성으로 유효성분이 작물체내로 고르게 전달됩니다.
또한, 방제가 어려운 개각형 깍지벌레에 대한 밀도억제 효과를 나타냅니다.

산란억제 및 불임효과

성충에 대한 산란억제 및 불임효과로 작물을 보호하고 피해를 최소화 합니다.



감나무주머니깍지벌레




가루깍지벌레



적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감)	미국선녀벌레	다발생기 경엽처리	10mℓ	수확 21일전	3회 이내
	감나무주머니깍지벌레				
	감관총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리			
	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리			
	꽃매미				
감귤	화살깍지벌레	다발생기 경엽처리		수확 14일전	2회 이내
대추	콩꼬투리혹파리	발생초기 경엽처리		수확 21일전	
배	미국선녀벌레	다발생기 경엽처리			
	가루깍지벌레	발생초기 경엽처리			
	꽃매미				
복숭아	갈색날개매미충	다발생기 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	3회 이내
	꽃매미				
	미국선녀벌레				
	가루깍지벌레				
	사과	썩덩나무노린재			
갈색날개매미충		발생초기 경엽처리	수확 21일전		
미국선녀벌레		다발생기 경엽처리			
썩덩나무노린재		발생초기 10일간격 경엽처리			
포도	꽃매미	다발생기 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	2회 이내
	가루깍지벌레	부화유충 다발생기 경엽처리			
	갈색날개매미충	다발생기 경엽처리			
	미국선녀벌레				

효율적인 “깍지벌레” 방제시기



“꼭지벌레” 방제효과



tip! 각지벌레 방제 시 유의사항

① 월동기 후 해빙기 방제 철저 ② 약충 발생시기 방제 철저 ③ 잎, 줄기에 약제를 충분히 살포

꼭지벌레 방제적기


- 1세대
부화약충기 : 5월

- 2세대
부화약충기 : 7월

※ 밀도가 높아지는 시기로, 일시에 부화하지 않으므로 사전 예찰 후 살포하여 주십시오.



가루깍지벌레



감나무주머니꼭지벌레

사용
방법

1. 각지벌레는 잎과 과실 뿐만 아니라 줄기에도 발생이 심하므로 나무 전체에 충분한 약량을 살포하여 주십시오.
2. 이 약제는 유충 및 약충을 주요 방제대상으로 하기 때문에 발생초기에 사용하여 주시고 발생밀도가 높을 경우에는 약량을 높여 살포하여 주십시오.



주의 사항

1. 8월에는 감단감에 약해 우려가 있으니 사용에 주의하십시오.
2. 이 농약은 누에에 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
3. 감단감에 사용할 경우 윤과기 이후에 사용시 과피에 약해가 발생할 우려가 있으므로 사용에 주의하십시오.