


숨은 해충까지 시원하게 날린다!

빅샷

입상수화제



담배나방



복숭아혹진딧물

품목명 : 아세타미프리드 · 에마멕틴벤조에이트 입상수화제 유효성분 : Acetamiprid 6%+Emamectin benzoate 2% 계통 : 클로르니코티닐계(4a)+항생제(6)
 독성 : 저독성, 어독성 II급 포장단위 : 100g, 250g


「빅샷」 입상수화제 특징

- ① 강력한 침투이행성 및 침달성으로 숨어 있는 해충 방제가능
 침투이행성이 뛰어난 '아세타미프리드'와 침달성이 뛰어난 '에마멕틴벤조에이트'의 합제로 숨어 있는 해충방제에도 효과가 뛰어납니다.
- ② 나방뿐만 아니라 총채벌레, 굴파리, 진딧물 등 동시방제
 나방, 총채벌레, 굴파리 등 다양한 해충을 방제하여 경제적입니다.
- ③ 빠른 약효발현과 긴 약효 지속기간
 속효성과 침투이행성이 뛰어나 작물피해를 최소화합니다.
- ④ 뛰어난 작물 안전성
 작물 안전성이 뛰어나 약해 걱정이 없으며, 전 생육단계에 사용이 가능합니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감귤	굴굴나방	발생초기 10일간격 경엽처리	10g	수확 14일전	2회 이내
	파리류	발생초기 경엽처리			
고추 (단고추류)	담배나방	발생초기 10일간격 경엽처리	10g(100mℓ/주)	수확 5일전	3회 이내
	목화진딧물	다발생기 경엽처리			
	복숭아혹진딧물				
딸기	작은뿌리파리	발생초기 10일간격 관주처리	10g	수확 7일전	2회 이내
무	벼룩잎벌레	발생초기 경엽처리			
	배추	무테두리진딧물	다발생기 경엽처리	10g	수확 14일전
배추좀나방					
사과	조팝나무진딧물	발생초기 경엽처리	10g	수확 7일전	2회 이내
수박(복수박)	아메리카잎굴파리	발생초기 7일간격 경엽처리			
오이	오이총채벌레		발생초기 10일간격 경엽처리	10g	수확 2일전
	파(쪽파)	파굴파리			
	파총채벌레			수확 7일전	

「빅샷」
입상수화제
특징



침투이행성
「빅샷」의 성분이 작물의 물관을 통해 새로운 잎까지 이동


침달성
「빅샷」의 성분이 작물의 잎 표면에서 속까지 이동

KEY POINT

- 1. 약제가 직접 닿지 않은 부분에도 방제효과 발휘
- 2. 잎 속 및 뒷 면의 숨은 해충까지 방제
- 3. 약효가 오랜기간 지속



「빅샷」 입상수화제 방제효과

담배나방 방제효과 (고추)



담배나방 피해

목화진딧물 방제효과 (고추)




「빅샷」 처리 3일 후


무처리 당일

무처리 3일 후

파총채벌레 방제효과 (파)



배추좀나방 방제효과 (배추)



1. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 시간에는 살포하지 마십시오.
2. 이 농약은 누에에는 (장기간) 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고, 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 살포하지 마십시오.