

강력한 섭식중단, 뛰어난 나방방제 효과!



담배나방



파밤나방

스파링

입상수화제

품목명 : 인독사카브 입상수화제 유효성분 : Indoxacarb 30% 계통 : 옥사디아진계 (22a) 독성 : 저독성, 어독성 II급 포장단위 : 3.4g

「스파링」 입상수화제 특징

- 1 뛰어난 나방 유충 방제 효과
- 2 강력한 섭식중단 효과, 뛰어난 작물보호 효과
- 3 강한 내구성, 긴 약효지속기간

유충의 각령기별 높은 활성 및 3령 이후의 노령유충에도 뛰어난 방제 효과를 나타냅니다.

강력한 소화중독, 접촉독으로 빠른시간(2~4시간)내에 섭식행위 중단시켜 작물의 피해를 최소화시킵니다.

약효지속기간이 길어 인시목 해충(담배나방, 파밤나방) 방제에 효과적입니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감귤	차잎말이나방	다발생기 경엽처리	3.3g	수확 14일전	3회 이내
갯기름나물(방풍)	파리류	발생초기 경엽처리			1회 이내
고들빼기	애물결들명나방				
고추(단고추류)	파밤나방	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 5일전	3회 이내
	담배나방				2회 이내
근대	열대거세미나방	발생초기 경엽처리		수확 14일전	3회 이내
녹두	파밤나방	다발생기 경엽처리			2회 이내
달래	담배거세미나방	발생초기 경엽처리		수확 31일전	1회 이내
당귀(뿌리)	파밤나방				
더덕	도둑나방				
땅콩	파밤나방	다발생기 경엽처리	수확 7일전	2회 이내	
들깨(잎)	담배거세미나방			1회 이내	
배청채	배추좀나방	발생초기 경엽처리	6g	수확 14일전	2회 이내
배추		다발생기 경엽처리	2.2g		
	열대거세미나방	발생초기 경엽처리	3.3g	수확 7일전	3회 이내
벼	파밤나방				
복숭아	열대거세미나방	발생초기 7일간격 경엽처리	1.7g	수확 21일전	
	복숭아순나방				
부추	복숭아심식나방	발생초기 10일간격 경엽처리	3.3g	수확 14일전	
	열대거세미나방	발생초기 경엽처리			
사과	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 7일전	1회 이내
	복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리			
살구	복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 21일전	2회 이내
쑥갓		발생초기 경엽처리			
석류	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 7일전	1회 이내
아로니아	복숭아순나방	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 30일전	
오미자	미국흰불나방	발생초기 경엽처리		수확 7일전	2회 이내
오이	버찌가는잎말이나방				
	열대거세미나방		다발생기 경엽처리	수확 3일전	3회 이내
콩	목화바둑명나방				
파	담배거세미나방	발생초기 경엽처리	수확 14일전	2회 이내	
파(쪽파)	파밤나방	발생초기 경엽처리			
	파굴파리	발생초기 10일간격 경엽처리			