

흡즙해충 방제의 최강자

파라슈트

액상수화제



사과혹진딧물



담배가루이

품목명 : 이미다클로프리드 액상수화제 유효성분 : Imidacloprid 8% 계통 : 네오니코티노이드계 (4a) 독성 : 보통독성, 어독성 III 급 포장단위 : 100mL, 250mL

「파라슈트」 액상수화제 특징

- ① 빈틈없는 해충 방제 강력한 침투이행성으로 약제가 작물에 직접 처리되지 않은 부분의 해충까지 방제할 수 있습니다.
- ② 광범위한 살충 효과 진딧물은 물론 배나무이류, 굴나방, 총채벌레, 가루이, 깍지벌레 등에 효과가 우수합니다.
- ③ 빠른 약효 발현 및 긴 약효지속성 효과가 빨리 나타나며, 약효가 오랜기간 지속됩니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감귤	굴굴나방	하지발생기 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 21일전	3회 이내
	조팝나무진딧물	발생초기 경엽처리			
	파리류				
고려엉겅퀴(곤드레나물)	싸리수염진딧물	다발생기 경엽처리		수확 14일전	2회 이내
고수	아카시아진딧물	발생초기 경엽처리		수확 7일전	
고추(단고추류)	목화진딧물			수확 5일전	3회 이내
	복숭아혹진딧물				
나디아				수확 7일전	2회 이내
녹색꽃양배추(브로콜리)	양배추가루진딧물	다발생기 경엽처리		수확 5일전	
다채(비타민)	복숭아혹진딧물			수확 14일전	3회 이내
배	꼬마배나무이	주발생기 수관처리			
부추	총채벌레	발생초 7일간격 경엽처리		수확 3일전	2회 이내
블루베리	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리		수확 21일전	3회 이내
사과	사과혹진딧물				
	조팝나무진딧물				
상추(양상추)	싸리수염진딧물			수확 7일전	2회 이내
아로니아	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리		—	—
장미	담배가루이	발생초 7일간격 경엽처리		수확 5일전	3회 이내
착색단고추류		발생성기 7일간격 경엽처리			
참다래(키위)	애매미충	발생초기 경엽처리		수확 7일전	2회 이내
패션프루트	갈색날개매미충				