

진딧물, 나방, 총채벌레 등 해충방제의 보증수표!

흑룡

수화제



조팝나무진딧물



굴굴나방

품목명 : 아세페이트 · 이미다클로프리드 수화제 유효성분 : Acephate 20% + Imidacloprid 5% 계통 : 유기인계(1b) + 네오니코티노이드계(4a)
 독성 : 저독성, 어독성 III 급 포장단위 : 200g, 500g

「흑룡」 수화제 특징

- 1 강력한 침투이행성, 긴 약효 지속력** 두 성분의 강력한 시너지 효과로 탁월한 약효를 나타내어 장기간 약효가 지속됩니다.
- 2 다양한 적용작물** 감귤, 사과, 배, 감, 포도 등 과수류와 고추, 오이, 배추 등 채소류 및 벼, 잔디에도 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 3 광범위한 해충에 효과 발휘** 진딧물류, 총채벌레류, 가루이류, 노린재류, 멸구류 및 굴굴나방 등 다양한 해충을 방제할 수 있습니다.
- 4 저항성이 발현된 흡즙 해충에 우수한 효과** 작용기작이 다른 두 약제의 상호작용으로 진딧물, 총채벌레에도 우수한 효과를 나타냅니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감)	감관총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	20g	수확 14일전	3회 이내
	감꼭지나방	발생초기 경엽처리			
감귤	굴굴나방	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 21일전	2회 이내
	불록총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리			
고추(단고추류)	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리		수확 7일전	1회 이내
	목화진딧물				
녹두	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리		수확 14일전	
더덕	싸리수염진딧물			수확 7일전	
땅콩	더덕수염진딧물				수확 45일전
배	열대거세미나방	다발생기 경엽처리			3회 이내
	꼬마배나무이		수확 14일전		
배추	조팝나무진딧물				
	무테두리진딧물				
벼	복숭아혹진딧물				
복숭아 비트	벼멸구		6.7g	수확 21일전	2회 이내
사과	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리	20g	수확 7일전	
오이	사과혹진딧물	다발생기 경엽처리		20g	수확 14일전
	조팝나무진딧물		수확 2일전		
잔디	아메리카잎굴파리	발생초기 7일간격 경엽처리	20g(1.2ℓ/㎡)		
	온실가루이				
콩	거세미나방류	유충 발생초 경엽처리	20g		
	굴벵이류	유충 부화기 토양관주처리			
토마토(방울토마토)	싸리수염진딧물	발생초기 경엽처리	20g	수확 14일전	3회 이내
	열대거세미나방				
	꽃매미	발생초기 10일간격 경엽처리			
포도	담배가루이	발생초기 7일간격 경엽처리	20g	수확 2일전	2회 이내
	열대거세미나방	발생초기 경엽처리			
포도	애무늬고리장님노린재	다발생기 경엽처리	20g	수확 30일전	3회 이내
	꽃매미				