



www.hescience.co.kr

배추 무름병

복숭아 세균구멍병

고추 세균점무늬병

HIT!

세균병 방제, 히트다 히트!

빅히트



옥솔린산·옥시테트라사이클린다이하이드레이트 입상수화제

적용대상

- 감귤, 매실/궤양병 · 감자, 당근, 마늘, 무, 배추, 양파/무름병
- 고추(단고추류)/세균점무늬병 · 복숭아, 자두/세균구멍병 · 사과/화상병 · 수박(복수박)/과일썩음병

☎ 고객상담전화 1661-4166

HES [주]한일싸이언스


· 안전사용기준을 잘 지켜 우수농산물을 생산합니다. · 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오. · 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오. · 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용 하십시오.
· 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 '농약관리법'에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

빅히트

세균병약
입상수화제

- 품목명 : 옥솔린산 · 옥시테트라사이클린 다이하이드레이트 입상수화제
- 유효성분 : Oxolinic acid 12% + Oxytetracyclinedihydrate 8%
- 계통 : 퀴놀론계(가4) + 항생제(라5)
- 독성 : 저독성, 어독성Ⅲ급
- 포장단위 : 500g

히트다 히트! 광범위 세균병 방제! 「빅히트」 입상수화제



특징

광범위 세균성 병해 전문 방제약제

유기합성 세균병 방제 성분인 옥솔린산과 고급 항생제인 옥시테트라사이클린다이하이드레이트의 혼합제로 세균성 병해에 대한 효과가 우수합니다.

내성균에 대한 탁월한 효과 및 방지

병원균 전 생활사에 약효를 발현하고 서로 다른 계통(가4+라5)으로 내성균에 대한 우수한 효과 및 출현을 방지합니다.

우수한 약효 지속기간

잔효력이 우수하여 병발생 억제 효과가 오랫동안 지속되며, 예방 및 치료 효과가 뛰어납니다.

환경에 대한 안전성

유용곤충 및 어패류에 영향이 적어 환경에 안전합니다.


적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
감귤	궤양병	새순 굳기전부터 15일간격 경엽처리	20g	수확 14일전	3회 이내	
감자	무름병	발병직전 7일간격 경엽처리		수확 21일전		
고추(단고추류)	세균점무늬병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 3일전	2회 이내	
당근	무름병			수확 7일전	3회 이내	
마늘		발병직전 7일간격 경엽처리		수확 21일전		
무		발생초기 7일간격 경엽처리		수확 7일전	2회이내	
매실	궤양병	낙화직후부터 10일간격 경엽처리		10g	수확 30일전	3회 이내
배추	무름병	발병초 7일간격 경엽처리			수확 14일전	
복숭아	세균구멍병	발병직전 10일간격 경엽처리	수확 7일전			
사과	화상병	개화초기 5일간격 경엽처리	20g	수확 40일전		
수박(복수박)	과일썩음병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일전		
양파	무름병	발병직전 7일간격 경엽처리		수확 21일전		
자두	세균구멍병	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 14일전		

「빅히트」 입상수화제 방제효과

자두 세균구멍병

[2021년 (주)분석기술과 미래]




「빅히트」 입상수화제



무처리

복숭아 세균구멍병

[2015년 (주)한얼사이언스 부설연구소]




「빅히트」 입상수화제



무처리

매실 궤양병

[2015년 (주)한얼사이언스 부설연구소]



「빅히트」 입상수화제



무처리



주의
사항

1. 고온시에 사용할 경우 약해를 일으킬 우려가 있으므로 한낮 뜨거운 시기를 피해 아침, 저녁 등 서늘할때 사용하십시오.
2. 이 농약은 연속하여 사용할 경우 병원균의 저항성이 유발될 수 있으므로 효과적인 방제와 저항성균 출현을 방지하기 위하여 작용기작이 다른 약제와 교호살포하여 주십시오.