

토양 병해의 고민 해결사!

언더카바

액제



품목명 : 프로파모카브하이드로클로라이드 액제 유효성분 : Propamocarb hydrochloride 66.5% 계통 : 카바메이트계(바4)
 독성 : 저독성, 어독성 III급 포장단위 : 100mL, 500mL

「언더카바」 액제 특징

- 1 신속한 흡수이행, 긴 약효 지속력** 뿌리로부터 침투하여 지상부의 줄기, 가지, 잎에 흡수이행되어 병균의 조직내 침입을 막는 예방효과가 탁월하며, 토양관주형 처리제이므로 약효지속기간이 긴 약제입니다.
- 2 작물에 안전 및 다양한 시기에 사용 가능** 파종기, 묘상기, 육묘기(포트 재배), 이식, 정식, 생육기, 종자소독 등 넓은 시기에 사용이 가능합니다.
- 3 화아분화 촉진 및 뿌리 활력 증대** 양분 흡수로 화방 생성, 성장 촉진, 수확량이 증대합니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
고추(단고추류)	역병	정식시기 및 발병전 관주처리	29mℓ (200mℓ/주)	수확 21일전	2회 이내
담배		이식시기 및 발병전 토양관주처리		파종 또는 이식기	1회 이내
담배	잘록병	파종직후 토양관주처리	50mℓ(5ℓ/m ²)		
맥문동	뿌리썩음병	발병직전 7일간격 토양관주처리	40mℓ(2ℓ/m ²)	수확 30일전	3회 이내
멜론	노균병	발병초기 경엽처리	20mℓ	수확 7일전	
무				수확 21일전	1회 이내
배추				수확 14일전	3회 이내
삼주(백출)				역병	수확 45일전
생강	뿌리썩음병	발병직전 토양관주처리	수확 30일전		
순무양배추(콜라비)	노균병	발병초기 경엽처리	20mℓ	수확 7일전	3회 이내
양배추 / 파		발병초기부터 7일간격 경엽처리		수확 14일전	
양파					
잔디	피티움마름병	발병초부터 10일간격 경엽처리	40mℓ(1ℓ/m ²)	-	-
황기	노균병	발병초기 경엽처리	20mℓ	수확 45일전	1회 이내



1. 액비, 생장조정제와는 섞어 쓰지 마십시오.
2. 장마 전에 약제를 처리하는 것이 약효를 증진시킬 수 있습니다.
3. 담배 역병 : 이식시기 및 발병 전에 토양에 관주하되 주당 200mℓ를 관주하십시오.
4. 담배 잘록병 : 파종직후 토양에 5ℓ/m²를 관주처리 하십시오.
5. 토양관주처리를 하는 제품으로 약제 성분이 작물 뿌리로부터 상부로 흡수이행되어 작물의 병을 예방하여주므로 경엽처리보다는 뿌리 부근에 관주처리하는 것이 좋습니다.