

비선택성제초제의 현명한 선택! 안전한 블랙번!

블랙번

액제



쇠뜨기



개망초

품목명 : 벤틀라존소듐·글루포시네이트암모늄 액제 유효성분 : Bentazone-sodium 10% + Glufosinate-ammonium 14%
 계통 : 벤조티아디아지논계(H06) + 포스피네이시드계(H10) 독성 : 저독성, 어독성 III급 포장단위 : 300ml, 500ml

「블랙번」액제 특징

- 1 **빠른 약효발현** 약제 살포 후 2~5일 부터 약효가 신속히 발현됩니다.
- 2 **후작물 안전성** 토양에 떨어진 유효성분이 미생물에 의해 신속히 분해되므로 후작물에 안전합니다.
- 3 **오랜 지속효과** 잡초 지상부를 완전히 고사시키며 동시에 다년생 잡초의 재생을 장기간 억제합니다.
- 4 **강한 내우성** 우수한 내우성으로 안정적인 약효를 발현합니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약량	살포량
감자(휴간)	일년생잡초	잡초생육기 밭고랑(휴간) 잡초 경엽처리(비닐피복재배)	60ml	300ml	100ℓ
고추(휴간)					
고려엉겅퀴(곤드레나물)					
양파(휴간)					
참외(휴간)					
콩(휴간)	일년생 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리	100ml	500ml	150ℓ
감귤					
대추					
배			133ml	1,000ml	
사과					
포도					
논둑					
비농경지					


사용 방법

- 이 농약은 잡초생육기 경엽처리용 비선택성제초제이므로 잡초가 충분히 자랐을 때 잎과 줄기에 약액이 충분히 골고루 묻도록 살포하십시오.
- 이 농약은 살포한 후 경운하거나 잡초를 베고자 할 경우에는 안정된 약효가 발현될 수 있도록 10일이상 지난 후 실시하십시오.
- 이 농약은 잡초의 키가 20~30cm 정도 자랐을 때 뿌리면 가장 효과적이며 잡초의 키가 30cm 이상 커지거나 발생밀도가 높을 경우에는 정도에 따라 약량을 증가하여 뿌리거나 30cm 이하로 예초한 후 사용하십시오. 단, 채소 및 밭고랑(휴간) 처리인 경우 잡초가 10~15cm 정도 자랐을 때 살포하십시오.


주의 사항

- 이 농약은 비선택성제초제이므로 약액이 농작물의 잎은 물론 어린줄기 및 과실 등에 묻을 경우 약해가 발생하오니 약액이 농작물에 묻지 않도록 주의하십시오.
- 발작물의 생육기 헛골처리나 논둑에 사용할 경우에는 분무기 노즐에 비산방지 덮개를 부착하여 살포된 약액이 작물에 묻지 않도록 주의하십시오.

빠르고 오래가는 방제효과



초종별 방제효과



강한 내우성

• [강우량] 15mm 이내 • [강우시간] 30~40분 이내 • [강우조건] 약제처리 후 1~2시간 이내

