

퀵스타

비선택성제초제
액제

- 품목명 : 글루포시네이트암모늄 · 엠시피에이 액제
- 유효성분 : Glufosinate-ammonium 15% + MCPA 7%
- 계통 : 포스파닉에시드계(H10) + 페녹시계(H04)
- 독성 : 저독성, 어독성 III 급
- 포장단위 : 300mL, 500mL

빠르다! 확실하다! 속시원한 비선택성제초제!



특징

난방제 잡초에 대한 탁월한 방제효과

쑥, 망초, 쇠뜨기, 닭의장풀 등 난방제 잡초에 탁월한 방제효과를 나타냅니다.

뛰어난 취 및 잡관목 방제효과

방제가 어려운 취와 잡관목(산딸기, 아카시아, 찔레)에 대한 방제효과가 뛰어나며, 약효가 오래 지속됩니다.

빠른 약효 발현 및 긴 약효 지속기간

잡초의 잎과 줄기로 빠르게 흡수되어 처리 후 2~3일 경부터 약효가 나타나며, 약 30일 이상 약효가 유지됩니다.

잡초 근부까지 영향을 주는 우수한 약효

잡초 지상부를 완벽하게 고사시켜 잡초 뿌리의 생육을 억제시킵니다.



적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약량	살포량
논둑	일년생 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리	100mL	500mL	
감귤					
무(휴간)	일년생잡초	잡초생육기 발고령(휴간) 경엽처리(비닐피복재배)	60mL	300mL	100L
배추(휴간)					
복숭아	일년생 및 다년생잡초	잡초발생초기 경엽처리	50mL	250mL	
배					
포도					
사과					
비농경지	잡관목(산딸기/아카시아/찔레)	생육초기 경엽처리	125mL	750mL	120L
	취	취 생육초기(2~3m이내) 경엽처리			



1. 이 농약은 잡초생육기 경엽처리용 비선택성제초제이므로 잡초가 충분히 자랐을 때 잎과 줄기에 약액이 충분히 골고루 묻도록 살포하십시오.
2. 이 농약을 살포한 후 경운하거나 잡초를 베고자 할 경우에는 안정된 약효가 발현될 수 있도록 10일 이상 지난 후 실시하십시오.
3. 약제 살포 후 3~6시간 이내에 비가오면 약효가 떨어질 수 있으니 강우가 예상될 때에는 사용하지 마십시오.



1. 이 농약은 비선택성제초제이므로 약액이 농작물의 잎은 물론 어린줄기 및 과실 등에 묻을 경우 약해가 발생하오니 약액이 농작물에 묻지 않도록 주의하십시오.
2. 이 농약을 사용할 때에는 반드시 저비산 노즐과 비산방지캡이 장착된 비선택성제초제 전용 분무기 및 살포기구를 사용하십시오.
3. 동력분무기를 사용할 때에는 약액의 비산 우려가 있으므로, 저압으로 주변작물로 약액이 묻지 않도록 주의하여 살포하십시오.

「퀵스타」 액제 방제효과

● 비농경지(일년생 및 다년생 잡초)



● 칩



초종별 방제효과

