

전통의 역병·노균병 전문 약제

온저내

수화제



오리 노균병



고추 역병

품목명 : 디메토모르프 수화제 유효성분 : Dimethomorph 25% 계통 : 시나믹에시드계(아5) 독성 : 저독성, 어독성 III급 포장단위 : 100g, 500g

「온저내」 수화제 특징

- ① 우수한 예방 및 치료효과
- ② 긴 약효 지속력
- ③ 우수한 살균효과
- ④ 환경 친화적 안전성 약제
- ⑤ 우수한 내구성

강한 침투이행성 약제로 예방, 치료효과가 우수합니다.

약효 지속기간이 길어 장기간 병 발생을 막아줍니다.

난균강류(역병, 노균병)의 전 생육기간에 작용하여 살균효과를 높입니다.

작물에 잔류가 거의 없고, 천적과 수생 생물 및 조류 등에 안전성이 높은 저독성 약제입니다.

약제 살포 후 1시간 이후에 비가와도 안정적인 효과를 발휘합니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	역병	발병초 경엽처리	20g	수확 3일전	2회 이내
감자		발병직전부터 10일간격 경엽처리		수확 14일전	4회 이내
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워)	노균병	발생초기 경엽처리		수확 21일전	2회 이내
고추(단고추류)	역병	발병직전부터 10일간격 경엽처리		수확 7일전	1회 이내
고추(잎)		발병직전 경엽처리			3회 이내
냉이 / 다채(비타민) 로케트(루꼴라)	노균병	발병초기 경엽처리		수확 10일전	1회 이내
대추 / 더덕	역병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일전	3회 이내
들깨(잎)		발병초부터 7일간격 경엽처리		수확 30일전	1회 이내
망고 / 머위	역병	발병초기 경엽처리	20g	수확 7일전	3회 이내
멜론	노균병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 30일전	1회 이내
명아주		발병초기 경엽처리		수확 7일전	3회 이내
무		발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일전	
무화과	역병	발병초 10일간격 경엽처리			
부추	노균병	발생초기 경엽처리			
배추		발병초 10일간격 경엽처리			

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
상추	노균병	발병초부터 7일간격 경엽처리	20g	수확 10일전	1회 이내
양상추 / 순무유채		발병초기 경엽처리		수확 7일전	3회 이내
순무양배추(콜라비)				—	—
스타티스	역병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일전	1회 이내
시금치	노균병	발병초부터 7일간격 경엽처리		수확 7일전	2회 이내
썩갓		발병초 7일간격 경엽처리		—	—
안개초	역병			발병초기 경엽처리	수확 7일전
유채(잎) / 케일	노균병	발병초기 경엽처리		2회 이내	
양파		발병초 7일간격 경엽처리			
열무		발병초기 경엽처리		수확 5일전	
오미자	역병	3회 이내			
오이	노균병				수확 14일전
유자	역병			발병초기 경엽처리	수확 50일전
인삼		발병직전 10일간격 경엽처리	수확 21일전		
조	잎집무늬마름병	발병초 10일간격 경엽처리	20g	수확 7일전	2회 이내
쪽파	노균병	발병초부터 7일간격 경엽처리		수확 45일전	3회 이내
참다래(키위)	역병	발병초기 경엽처리			1회 이내
천궁	잎마름병			발병초 7일간격 경엽처리	수확 7일전
청경채	노균병	발병초기 7일간격 경엽처리		수확 40일전	
치커리					발병초기 경엽처리
콩		발병초 10일간격 경엽처리		3회 이내	
패션프루트	역병	발병초기 경엽처리			수확 7일전
해바라기	노균병				수확 21일전
호박					수확 3일전
호프					수확 14일전
황기		역병		발병초 10일간격 경엽처리	수확 21일전
		발병초기 경엽처리			



사용
방법

1. 발병직전부터 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌리십시오.
2. 장마 직전부터 예방 위주로 살포하십시오.



주의
사항

1. 석회유황합제, 석회보르도액 등 강알칼리성 약제와 섞어 쓰지 마십시오.
2. 내성균 출현을 방지하기 위해 지나친 연용을 피하고 다른 약제와 교대로 살포하십시오.