

No.1 프리미엄 종합살균제



참누리

액상수화제



잔디 라이족토니아마름병



고추 탄저병

품목명 : 아зок시스트로빈 · 플루디옥소닐 액상수화제 유효성분 : Azoxystrobin 15% + Fludioxonil 15% 계통 : 스트로빌루린계(다3) + 시아노피롤계(마2)
독성 : 저독성, 어독성 II 급 포장단위 : 100mL, 250mL

「참누리」액상수화제 특징

- 1 내성 병원균에 대한 우수한 효과
- 2 뛰어난 내구성 및 지효성
- 3 폭 넓은 작물 병해 방제 효과
- 4 강력한 침투이행성 및 침달성
- 5 병원균의 전 생활사에 작용

작용기작이 다른 두 약제의 혼합제로 내성균에 우수한 효과를 나타냅니다.

침투이행성이 뛰어난 아зок시스트로빈이 내부에서 플루디옥소닐이 작용표면에서 효과적으로 약효를 발휘합니다.

다양한 작물, 다양한 병해에 사용가능한 종합살균제입니다.

약액이 묻지 않은 부위까지 전달되어 병원균을 방제 할 수 있습니다.

포자 발아 억제, 포자 형성 저해 및 균사 생육저지 작용을 통해 병반 진전을 저해합니다.

적용병해충 및 사용량


작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감귤	검은점무늬병	6월상순부터 14일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	3회 이내
	더듬이병	춘지발생초 14일간격 경엽처리			
	잿빛곰팡이병	발병초 10일간격 경엽처리			
고추(단고추류)	탄저병			수확 7일전	2회 이내
다채(비타민)	균핵병	발생초기 경엽처리		수확 21일전	3회 이내
대추	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리			
딸기	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리	수확 3일전		
마늘	잎마름병	발병초 10일간격 경엽처리	100mℓ/10a	수확 14일전	
	잎마름병(무인항공기)	발생초기 10일간격 경엽처리			
무	노균병		10mℓ	수확 7일전	
배추	균핵병	수확 14일전			
벼	키다리병	침종전 24시간 종자침지처리		파종기	1회 이내
	깨씨무늬병	침종전 24시간 침지처리			
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 21일전	3회 이내
수박(복수박)	균핵병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일전	
순무양배추(콜라비)		발병초기 경엽처리			
순무유채	노균병		2회 이내		
시금치	균핵병				
신선초 / 쑥부쟁이	점무늬병				
양파	균핵병	발병초 7일간격 경엽처리	수확 14일전	3회 이내	
	노균병				
오이	발병초 7일간격 경엽처리	수확 3일전			
	잿빛곰팡이병		발병초 7일간격 경엽처리		

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
인삼	잣빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리	10mℓ	수확 30일전	3회 이내
	점무늬병 / 탄저병	발병초 10일간격 경엽처리			
아욱 / 케일 / 향미나리(파슬리)	균핵병	발생초기 경엽처리		수확 7일전	2회 이내
자두	잣빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일전	3회 이내
잔디	동전마름병	발병초 10일간격 토양관주처리	8mℓ(1ℓ/m ²)	—	—
	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 토양관주처리			
	여름잎마름병(썸머패취)	발병직전(5월 중순경)부터 14일간격 관주처리			
포도	잣빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리	10mℓ	수확 7일전	3회 이내

「참누리」 액상수화제 방제효과


인삼 잣빛곰팡이병




무처리



「참누리」




잔디 동전마름병



무처리



「참누리」




잔디 라이족토니아마름병



라이족토니아마름병

처리 7일 후



주의
사항

1. 인삼 전엽기에는 약해의 우려가 있으므로 잎이 완전히 전개한 뒤(6개월 이후)에 사용하십시오.
2. 이 농약은 침투강화 성분의 전착제와 혼용시 약해의 우려가 있습니다.