

강력한 침투이행성으로 빠르고 확실한 치료효과

칸타타

유제



잔디 라이족토니아마름병



고추 갈색점무늬병

품목명 : 테부코나졸 유제 유효성분 : Tebuconazole 25% 계통 : 트리아졸계(사) 독성 : 저독성, 아독성 III급 포장단위 : 100mL, 250mL, 500mL

「칸타타」 유제 특징

- ① 강력한 침투이행성으로 탁월한 치료효과 병원균의 세포막 성분인 에르고스테롤의 생합성을 억제하여 방제효과를 나타냅니다.
- ② 잔디밭 관리에 효율적 처리 후 잔디 색상을 진하게 하고, 생장억제 효과가 있어 예취 횟수를 경감시켜 일손을 덜어주는 경제적 효과가 있습니다.
- ③ 각종 병해에 우수한 효과 탄저병을 중심으로 갈색무늬병, 흑색썩음균핵병 등에도 우수한 효과가 있습니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20L 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가족나무	녹병	발병초기 경엽처리	10mL	-	-
강낭콩 / 근대	탄저병			수확 7일전	3회 이내
고추(단고추류)	갈색점무늬병	발병초부터 10일간격 경엽처리	20mL	수확 3일전	
당귀(뿌리)	점무늬병		10mL	수확 14일전	
대추	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	8mL	수확 7일전	
더덕	녹병	발병초부터 10일간격 경엽처리	10mL	수확 14일전	4회 이내
땅콩	그물무늬병			수확 30일전	3회 이내
매실 / 유자	탄저병	발병초기 경엽처리	10mL	수확 21일전	2회 이내
머루	갈색무늬병			수확 7일전	3회 이내
민들레	점무늬병	발병초 15일간격 수관살포	10mL(원액 2L/ha)	수확 30일전	2회 이내
밤(밤나무)	탄저병			수확 14일전	3회 이내
방울다다기양배추	검은점무늬병	발병초기 경엽처리	10mL	수확 7일전	
배초향(방아)	탄저병			발병초부터 7일간격 토양관주처리	10mL (1L/m ²)
	잿빛곰팡이병	적설직전 10일간격 토양관주처리	3회 이내		
부추	흑색썩음균핵병	발병초기 경엽처리		10mL	수확 3일전
블루베리	탄저병		수확 21일전		
비파	점무늬병	발병초기 10일간격 경엽처리	10mL	수확 14일전	3회 이내
석류 / 양앵두(체리)	탄저병			수확 3일전	
여주	잿빛곰팡이병	발병초부터 10일간격 토양관주처리	10mL	-	-
	녹병			발병초부터 10일간격 토양관주처리	
잔디	라이족토니아마름병	발병초부터 10일간격 토양관주처리	10mL (1L/m ²)	-	-
	설부소립균핵병			발병초부터 10일간격 토양관주처리	
지치	종자소독	파종전 24시간 침지처리	5mL	파종기	1회 이내
참다래(키위)	탄저병	발병초기 경엽처리	10mL	수확 30일전	3회 이내
	점무늬병			-	-
카네이션	녹병	발병초기 경엽처리	10mL	-	-
콩 / 팥	탄저병			수확 14일전	3회 이내