

광범위 종합살균제

푸리온

수화제



품목명 : 디페노코나졸 수화제 유효성분 : Difenoconazole 10% 계통 : 트리아졸계(사) 독성 : 저독성, 어독성 II급 포장단위 : 250g

「푸리온」 수화제 특징

- ① 감염초기에 강한 치료효과
- ② 넓은 적용 범위
- ③ 강한 내구성 및 긴 약효 지속력

작물의 감염초기에 치료효과가 있으며, 오랫동안 병원균의 침입을 막아줍니다.
살균대상의 범위가 넓어 여러 작물의 주요병해를 동시에 방제할 수 있습니다.
내구성이 강하며 약효가 오랫동안 지속됩니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 200 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감)	동근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	10g	수확 14일전	5회 이내
	탄저병	6월 중순부터 10일간격 경엽처리			
감귤	더듬이병	춘지발생시 15일간격 경엽처리		수확 21일전	3회 이내
녹두	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리			
대추	줄기썩음병	발병초기 경엽처리		수확 7일전	4회 이내
마(산약)	갈색무늬병	발병초부터 7일간격 경엽처리			
망고	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일전	3회 이내
모과	붉은별무늬병	발병초기 경엽처리			
무	검은무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 21일전	2회 이내
	앞마름병	발병초기 경엽처리			
미나리	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	수확 7일전	5회 이내	
배	검은무늬병	발병초부터 10일간격 경엽처리			
벗나무	갈색무늬구멍병	발병초 10일간격 경엽처리	10g	-	-
복숭아	검은점무늬병	발병초부터 7일간격 경엽처리		수확 3일전	5회 이내
복분자	잿빛무늬병	발병초기 경엽처리	수확 7일전	3회 이내	
블루베리	줄기마름병	발병초 10일간격 경엽처리			
	비트	줄기썩음병/탄저병	발병초기 경엽처리	수확 3일전	2회 이내
점무늬병		발병초부터 10일간격 경엽처리			
사과	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	6.7g	수확 7일전	5회 이내
	검은별무늬병	꽃이 피기전 1회 꽃이진후 10일간격 경엽처리			
	겹무늬썩음병	6월 중순부터 10일간격 경엽처리			
산딸기	점무늬낙엽병	발병직전부터 10일간격 경엽처리	6.7g	수확 7일전	5회 이내
	녹병/탄저병	발병초기 경엽처리			
살구	잿빛무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10g	수확 14일전	3회 이내
석류	탄저병	발병초기 경엽처리			
수수	잎집무늬마름병	발병초기 경엽처리	10g	수확 30일전	2회 이내
	탄저병	발병초 7일간격 경엽처리			
썩갓	앞마름병	발병초 7일간격 경엽처리	수확 7일전	3회 이내	
아로니아	갈색무늬병	발병초기 경엽처리			
아스파라거스	검은무늬병	발병초 7일간격 경엽처리	수확 35일전	5회 이내	
양행두(체리)	잿빛무늬병	발병초 10일간격 경엽처리			
인삼	점무늬병	발병초부터 10일간격 경엽처리	수확 7일전	3회 이내	
자두	탄저병	발병초기 경엽처리			
지황	겹동근무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	수확 14일전	2회 이내	
취나물	점무늬병	발병초 7일간격 경엽처리			
큰조롱(백수오)	갈색무늬병	발병초기 경엽처리	수확 7일전	3회 이내	
호두	탄저병	발병초기 경엽처리			

*기타 자세한 등록사항은 「농촌진흥청 농약안전정보시스템」에서 확인 가능합니다.