

NEW
신제품

가루스타

원예용 살충제(가루이)

수화제

- 품목명 : 피리다벤 수화제 • 유효성분 : Pyridaben 20%
- 계통 : 피리다지논계(21a) • 독성 : 저독성, 어독성Ⅲ급 • 포장단위 : 200g



안전하고 빠른 가루이 전문약제, 「가루스타」 수화제

특징

가루이, 응애 전문약제

응애 및 담배가루이 전문약제로 우수한 방제효과를 나타내며, 온실가루이도 방제가 가능합니다.

오래가는 약효, 강력한 내구성

방제적기에 사용할 경우 약효 지속기간이 30~40일 지속되는 잔효성이 긴 약제입니다.

접촉독 및 소화중독의 2중 살충효과

약제살포 후 빠르게 약효가 나타나며, 약 2시간 이내에 죽는 낙다운(Knock-down)효과를 나타냅니다.

응애의 전세대 방제 가능

피리다벤 성분은 전세대 방제가능 살비제로서, 응애의 알 부터 성충까지 모든 생육단계에 방제효과를 나타냅니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 200당 사용약량	안전 사용시기	안전 사용횟수
가지	담배가루이	발생초기 경엽처리	20g	수확 2일전	3회이내
감귤	꿀응애		10g	수확 14일전	2회이내
	석류가루이				
고추(단고추류)	차면지응애		수확 3일전		
멜론	담배가루이		20g	수확 14일전	3회이내
	온실가루이				
배	석류가루이		수확 15일전	2회이내	
	점박이응애		수확 7일전		
수박(복수박)	담배가루이		수확 3일전	3회이내	
착색단고추류		수확 5일전			
참외					

바이러스를 매개하는 '담배가루이' 초기 방제 중요!



토마토황화잎말림병(TYLCV)

'담배가루이'가 바이러스를 매개하여 일어나는 바이러스 병으로, 감염시 치료가 어려우므로 초기에 미리 방제하는 것이 중요합니다.

병원체 토마토황화잎말림바이러스 (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV)

기주작물 가지과 작물 (고추, 파프리카, 토마토, 가지 등)

매개충 담배가루이

피해증상 심한 황화현상이 나타나며, 잎이 오그라들고 주름지는 증상이 나타남. 심할 경우 고사되며, 작물이 정상적인 성장을 하지 못해 수확량 감소