

# 응애스타

액상수화제

- 품목명 : 아바멕틴 · 에톡사졸 액상수화제
- 유효성분 : Abamectin 1.8% + Etoxazole 7.5%
- 계통 : 항생제(6) + 옥사졸린계(10b)
- 독성 : 보통독성, 어독성 I 급
- 포장단위 : 70mL, 170mL

## 알부터 성충까지! 응애방제의 새로운 스타!

### 특징

#### 응애 알부터 성충까지 한 번에 방제

응애의 전 생육단계에 방제효과를 나타내어 응애의 알, 약충, 성충까지 한 번에 방제가 가능합니다.

#### 내성/저항성 응애에 탁월한 효과 발휘

작용기작이 다른 두 성분의 합제로 내성 및 저항성을 나타내는 응애에도 탁월한 방제효과를 나타냅니다.

#### 빠르고 오래가는 방제효과

약제 살포 후 방제효과가 빠르게 나타나며, 약효가 오래 지속됩니다.

#### 고온기 살포에도 안정적인 약효 발현

응애의 밀도가 급속도로 증가되는 고온기에도 안정적인 약효를 나타냅니다.




### 적용병해충 및 사용량

| 작물명      | 적용해충     | 사용시기 및 방법          | 물 20ℓ 당<br>사용약량 | 안전사용기준         |         |         |       |
|----------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------|---------|-------|
|          |          |                    |                 | 사용시기           | 사용횟수    |         |       |
| 가지       | 점박이응애    | 발생초기 경엽처리          | 6.7mℓ           | 수확 3일전         | 2회이내    |         |       |
| 감귤       | 굴응애      |                    |                 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 14일전 | 3회 이내   |       |
|          | 굴녹응애     |                    |                 |                |         |         |       |
|          | 꽃노랑총채벌레  |                    |                 |                |         |         |       |
| 고추(단고추류) | 점박이응애    | 발생초기 경엽처리          |                 | 수확 5일전         | 2회 이내   |         |       |
| 대추       |          |                    |                 | 수확 14일전        |         |         |       |
| 딸기       |          |                    |                 | 수확 3일전         |         |         |       |
| 멜론       |          |                    |                 | 수확 14일전        | 3회 이내   |         |       |
| 배        | 꼬마배나무이   | 다발생기 경엽처리          |                 | 수확 14일전        | 2회 이내   |         |       |
| 복숭아      | 점박이응애    | 발생초기 경엽처리          |                 |                |         |         |       |
| 사과       | 사과응애     | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 |                 |                | 수확 14일전 | 3회 이내   |       |
|          | 점박이응애    |                    |                 |                |         |         |       |
| 수박(복수박)  | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리     |                 | 수확 7일전         |         |         | 2회 이내 |
|          | 점박이응애    | 발생초기 경엽처리          |                 |                | 발생초기    | －       |       |
| 자두       | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리     |                 | 수확 3일전         | 3회 이내   |         |       |
| 참외       | 점박이응애    | 발생초기 경엽처리          |                 |                |         | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 포도       | 점박이응애    | 발생초기 경엽처리          |                 |                |         |         |       |

## 「응애스타」 액상수화제 방제효과

[ (주)한얼사이언스 부설연구소 ]

### 수박 점박이응애




「응애스타」




무처리

### 배 점박이응애




「응애스타」



무처리

### 감귤 꿀응애




「응애스타」



무처리

### 사과 사과응애



「응애스타」



무처리

## 「응애스타」 액상수화제는 어떻게 응애를 방제할까요?

### “아바멕틴”

응애의 성충에 대한  
살비효과  
6

작용기작이 다른 두 성분이 한 번의 처리로  
응애의 알, 약충, 성충을 모두 방제합니다.  
또한 성충의 불임과 알의 부화를 억제 함으로써  
응애의 차세대 밀도를 감소시킬 수 있습니다.

### “에톡사졸”

응애의 알, 약충에 대한 살비효과,  
성충 불임 및 알 부화 억제  
10b

## 응애는 초기방제가 중요합니다

응애약은 발생초기 또는 한 잎당 1~2마리 발견될 때 부터 약제를 살포하여야 합니다. 왜냐하면 응애는 번식률이 굉장히 빨라서 초기에 방제 하지 않으면 밀도가 건잡을 수 없이 늘어나 전문약제로도 방제가 어려워 집니다. 또한, 응애는 매우 작고 주로 잎 뒷면에 서식하기 때문에 약제 살포시 물량을 충분히 하여 작물에 충분히 묻도록 구석구석 잘 살포하여야 합니다.