



예방 및 치료효과를 겸비한 종합살균제



감귤 잿빛곰팡이병



사과 탄저병

탄제로

수화제

품목명 : 카벤다짐·크레속시메틸 수화제 유효성분 : Carbendazim 40% + Kresoxim-methyl 20% 계통 : 카바메이트계(나) + 스트로빌루린계(다3)
 독성 : 저독성, 어독성II급 포장단위 : 500g

「탄제로」 수화제 특징

- ① 우수한 예방 및 치료효과 카벤다짐과 크레속시메틸의 혼합제로서 예방 및 치료효과를 겸비한 약제입니다.
- ② 특이한 표면 확산 침투성 및 침달효과 독특한 작용기작으로 기존 약제에 저항 성을 보이는 균에도 효과가 탁월합니다.
- ③ 우수한 2차 전염 확산 방지효과 병원균의 포자형성 저해로 과실로의 2차 전염 확산을 방지합니다.
- ④ 강한 내우성 및 긴 약효지속성 생육 초기~후기까지 발생하는 병원균을 방제할 수 있습니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감귤	검은점무늬병	6월 상순부터 14일간격 경엽처리	20g	수확 30일전	5회 이내
	잿빛곰팡이병	발병초 10일간격 경엽처리	10g		
	저장병	수확 30일전 경엽처리	20g		
겨자채	노균병	발생초기 경엽처리	10g	수확 7일전	3회 이내
고추(단고추류)	탄저병	발병초기 10일간격 경엽처리		수확 5일전	
들깨(잎)	노균병	발병초기 경엽처리		수확 7일전	
딸기	흰가루병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 3일전	
머루	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	13.3g	수확 21일전	5회 이내
배	검은별무늬병		10g		
	갈색무늬병		13.3g		
사과	검무늬씩음병	6월 중순부터 10일간격 경엽처리	20g	수확 30일전	3회 이내
	점무늬낙엽병	발병초 10일간격 경엽처리	13.3g		
	탄저병				
수박(복수박)	덩굴마름병	발병초 7일간격 경엽처리	10g	수확 7일전	4회 이내
오이	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 5일전	
	케일	노균병		발생초기 경엽처리	
포도	갈색무늬병/노균병	발병초 10일간격 경엽처리	13.3g	수확 30일전	4회 이내
	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리	10g		



1. 이 농약은 효율적인 방제를 위하여 작용기작이 다른 약제와 교대로 사용하십시오.



- 1. 이 농약은 전착제 및 침달성이 높은 영양제와의 혼용은 약해가 발생할 수 있으니 혼용하지 마십시오.
- 2. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.