

종합살균제(치료)

# 카브로빈

입상수화제

- 품목명 : 피라클로스트로빈 입상수화제
- 유효성분 : Pyraclostrobin 20%
- 계통 : 스트로빌루린계(다3)
- 독성 : 저독성, 어독성 I 급
- 포장단위 : 67g, 167g

## 명불허전 종합살균제

### 특징

- 뛰어난 예방 및 치료효과** 병원균의 침입저지 및 포자발아를 억제(예방효과)하며, 병원균의 포자형성과 생장을 저지하는 치료효과를 나타냅니다
- 빠른약효 발현 및 긴 약효지속기간** 약제살포와 동시에 작물체내로 흡수되어 효과가 신속하게 나타나고, 작물체 표피층에 부착되어 흡수되면서 지속적으로 효과를 나타냅니다.
- 우수한 침투이행성 및 침달성** 침투이행성 및 침달성이 우수하여 직접 약액이 닿지 않는 잎 뒷면 까지도 약효를 발휘합니다.
- 안정적인 효과** 기존 스트로빌루린계의 약제 대비 활성이 높고, 증발과 강우에 의한 약제 손실이 적어 장기간 안정적인 효과를 나타냅니다.
- 광범위한 적용 병해 및 작물** 다양한 적용병해 및 작물에 사용이 가능합니다.

### 적용병해충 및 사용량

※ 기타 자세한 등록사항은 「농촌진흥청 농약안전정보시스템」에서 확인 가능합니다.

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 200당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	6.7g	수확 20일전	4회 이내
고추(단고추류)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 5일전	3회 이내
고추(잎)		발병초기 경엽처리		수확 7일전	1회 이내
금감(금귤)	잣빛곰팡이병	발병초기 경엽처리	6.7g(5mL/주)	수확 14일전	3회 이내
낙엽송	모잘록병	발병초기 관주처리		-	-
녹두	탄저병	발병초기 경엽처리	6.7g	수확 21일전	3회 이내
다래	그을음병			수확 7일전	
	탄저병				
대추	역병			수확 14일전	
	잣빛곰팡이병			발병초기 7일간격 경엽처리	
도라지	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	수확 21일전	3회 이내	
땅콩	탄저병	발병초기 경엽처리	수확 7일전		
들깨(잎)	잣빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리	6.7g	수확 14일전	4회 이내
레몬	더듬이병	춘지발생시 경엽처리			
망고	잣빛곰팡이병	발병초기 경엽처리	10g(200mL/주)	수확 20일전	4회 이내
메밀	흰가루병				
		점무늬병	정식전 관주처리	40g	정식기
배	검은별무늬병	정식전 뿌리침지처리			
배추	뿌리혹병				

## 적용병해충 및 사용량

※ 기타 자세한 등록사항은 「농촌진흥청 농약안전정보시스템」에서 확인 가능합니다.

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
복분자	탄저병	발병초 7일간격 경엽처리	6.7g	수확 14일전	3회 이내
	잿빛곰팡이병	발병초기 경엽처리			
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일전	4회 이내
부추	잿빛곰팡이병				
블루베리	갈색무늬병	2회 이내			
비트	잿빛곰팡이병	발병초기 경엽처리		수확 14일전	3회 이내
	검무늬썩음병	6월상순부터 10일간격 경엽처리		수확 20일전	5회 이내
탄저병					
산딸기	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일전	3회 이내
	점무늬병	발병초기 경엽처리			
	녹병				
	탄저병				
잿빛곰팡이병					
살구	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일전	4회 이내
상추(양상추)	흰가루병	발병초기 경엽처리		수확 5일전	
생강	잎마름병			수확 21일전	
수박	탄저병	발병초기 10일간격 경엽처리		수확 14일전	
시금치	점무늬병	발병초기 경엽처리		수확 7일전	3회 이내
	잎곰팡이병				
아로니아	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일전	2회 이내
앵두	잿빛곰팡이병	발병초기 경엽처리	수확 7일전	3회 이내	
양미나리(셀러리)	검은무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	수확 7일전		
	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리			
양상추	노균병	발병초기 경엽처리	수확 5일전		
양앵두(체리) / 팔	탄저병	발병초기 10일간격 경엽처리	수확 14일전		
열무	노균병	발병초 7일간격 경엽처리	수확 7일전	4회 이내	
옥수수	이삭썩음병	발병초기 경엽처리			
유자	잿빛곰팡이병				
인삼	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	수확 14일전	4회 이내	
	탄저병				
잔디	동전마름병	발병초 7일간격 토양관주처리	10g	-	
	라이족토니아마름병		5g(1ℓ/m <sup>2</sup> )	-	
	피티움마름병				
참다래(키위)	역병	발병초기 경엽처리	수확 7일전	3회 이내	
	잿빛곰팡이병				
	탄저병				
큰조롱(백수오)	갈색무늬병	6.7g	수확 14일전	2회 이내	
파(쪽파)	녹병		수확 10일전	5회 이내	
포도	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리			



1. 하우스 작물 살포 시 전착제나 가능성 침투보조제와 혼용하지 마십시오.
2. 과수 : 이마녹탄딘트리아세테이트 액제와 혼용하지 마십시오.
3. 포도 : 테부펜피라드 유제 또는 가능성 침투보조제와 혼용하지 마십시오.