

논만세 유제

- 품목명 : 프레틸라클로르 유제
- 유효성분 : Pretilachlor 14%
- 계통 : 클로르아세트아닐라이드계(H15)
- 독성 : 저독성, 어독성 II급
- 포장단위 : 400mL

논잡초 방제는 논만세로 출발!

특징

이양전처리 제초제

클로르아세트아닐라이드계 제초제로 잡초 발생 전에 사용하는 제초제입니다.

편리성 및 노동력 절감

이양전처리제로 물에 희석하지 않고 원액 그대로 사용하기 때문에 편리합니다.

고른 확산성

논물에 고르게 퍼져 토양 속 잡초에 흡수되어 약효를 발휘합니다.

체계처리시 방제효과 상승

중기 제초제와 체계처리시 잡초방제 효과가 상승합니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용적기 및 방법	1,000m ² (10a)당 사용량
기계이앙벼	일년생잡초 (마디꽃, 물달개비, 여뀌, 피, 사마귀풀, 알방동사니, 발독외물)	씨레질 직후(이양전 2~3일) 수면처리	400mL



사용 방법

1. 물에 희석하지 않고 병에 든 원액을 그대로 살포합니다.
2. 씨레질로 논바닥을 잘 고른 후 토양이 드러나지 않게 수심을 3~4cm이상 유지하십시오.
3. 사용 전 수차례 병을 흔들고 난 후 병 아래 오목한 부분을 손으로 잡고 살포 폭을 10m정도로 하여 걸어가면서 5~6보마다 좌우로 한 번씩 휘둘러 뿌리십시오.
4. 약을 뿌린 후 이양 전까지 논물을 대거나 빼지 말고 그대로 유지하십시오.



주의 사항

1. 모래땅, 물빠짐이 심한 논, 연약한 묘가 이앙될 논에는 사용하지 마십시오.
2. 바람이 불 때는 약제살포를 피하시고 약제가 물의 흐름에 따라 이동되어 한곳에 몰리지 않도록 주의하십시오.
3. 이양 후 생육초기에 생육이 억제되는 경우가 있으나 곧 회복되어 그 후의 생육 및 수량에는 영향이 없습니다.
4. 약제살포 후 3~4일간은 물을 대거나 빼지 마십시오.
5. 이양심도가 1cm미만일 경우에는 약해 위험이 있으니, 이양심도가 1cm이상 되도록 깊게 이양하십시오.