

「썬쿠르즈」 입상수화제 특·장점

한 번의 처리로 진딧물, 노린재 동시방제!

2중 작용기작(접촉독, 소화중독)으로 과수 및 원예작물에 발생하는 전반적인 해충에 대해 방제가 가능한 광범위 살충제입니다

신속한 약효발현으로 작물피해 최소화

약제살포 후 약 1시간 이내 해충이 마비되어, 작물을 가해하지 않아 작물피해를 최소화합니다.

우수한 침투이행성으로 오래가는 약효

약효가 7~14일 이상 지속되어, 성충 및 약충의 발생밀도를 효과적으로 억제시킬 수 있습니다.

내성 및 저항성이 생긴 해충에도 우수한 약효

작용기작이 다른 두가지 성분의 합제로 내성 및 저항성이 생긴 해충에도 우수한 약효를 나타냅니다.

「썬쿠르즈」 입상수화제 적용해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감)	썬덩나무노린재	발생초기 경엽처리	6.7g	수확 14일전	3회 이내
	감꼭지나방				
	감나무주머니까치벌레				
감귤	귤굴나방/조팝나무진딧물			수확 2일전	2회 이내
	꽃노랑총채벌레/썬덩나무노린재				
고추(단고추류)	담배나방/목화진딧물/복숭아혹진딧물			수확 7일전	3회 이내
딸기	목화진딧물				
멜론	복숭아순나방			수확 14일전	2회 이내
	애무늬고리장님노린재				
배	무테두리진딧물			수확 14일전	3회 이내
	썬덩나무노린재				
복숭아	복숭아순나방			수확 14일전	3회 이내
	복숭아혹진딧물				
	사과혹진딧물				
사과	복숭아순나방/썬덩나무노린재			수확 7일전	2회 이내
	복숭아순나방벌레/조팝나무진딧물				
살구	썬덩나무노린재			수확 14일전	3회 이내
자두	썬덩나무노린재				
콩	콩진딧물/툽다리개미허리노린재			수확 14일전	3회 이내
포도	애무늬고리장님노린재				

www.hescience.co.kr

H [주]한일싸이언스

☎ 고객센터전화 1661-4166

· 안전사용기준을 잘 지켜 우수농산물을 생산합니다. · 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오. · 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오. · 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용 하십시오.
· 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 '농약관리법'에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

건강한 작물, 고수익 창출 위한 ‘골든티켓’!



www.hescience.co.kr

H [주]한일싸이언스

☎ 고객센터전화 1661-4166

「썬쿠르즈」의 빠른 방제효과

2022년, (주)한얼사이언스 부설연구소

사과 - 사과혹진딧물

속효성 (약제처리 2일 후)



썩덩나무노린재

속효성



톱다리개미허리노린재

속효성




「썬쿠르즈」의 오래가는 방제효과

2023년, (주)한얼사이언스 부설연구소

고추 - 목화진딧물

약제처리 3일 후 「썬쿠르즈」 처리구가 대조약제 대비 우수한 약효를 보였으며, 약제처리 14일 후까지 약효가 지속되었음

지효성 (약제처리 14일 후)




진딧물

2023년, (주)한얼사이언스 부설연구소

속효성 검증시험 (실내)

빠른 약효발현

약제처리 약 1시간 후부터
마비증상을 보였으며,
작물 흡즙 중단
약제처리 48시간 후
100% 치사율을 나타냄




진딧물

2022년, (주)한얼사이언스 부설연구소

지효성 검증시험 (실외)

긴 약효지속시간

약제처리 14일차 까지
우수한 약효를 보임



노린재


2023년, (주)한얼사이언스 부설연구소

지효성 검증시험 (실내)

긴 약효지속시간

노린재 지효성 시험은
과실에 약제 살포 후
충을 접종하여
평가하였음

* 약제처리 14일차 까지
약효가 우수하게
지속되었음



* 약제처리 후 1, 3, 5, 7, 10, 14일 차 마다 톱다리개미허리노린재 성충을 추가 접종한 후 사충률(%)을 조사하였음