

종합살균제 (스트로빌루린계)

액상수화제

NEW
신제품

수비탄

- 품목명 : 트리플록시스트로빈 액상수화제
- 유효성분 : Trifloxystrobin 22%
- 계통 : 스트로빌루린계 (다3)
- 독성 : 저독성, 어독성 1급
- 포장단위 : 100mL, 250mL

비 오기 전 준비, 우기 중에도 걱정없는 병해 방어!

• 탁월한 내우성 및 우수한 예방효과

뛰어난 내우성으로 장마 직전 또는 우기 중에도 안정적인 방제 효과를 유지합니다.

• 광범위한 종합살균제

다양한 병해에 대해 우수한 방제효과를 나타내며, 과수·채소류 등 다양한 작물에 적용 가능합니다.

• 안정적인 약효 지속효과

유효성분이 잎 표면의 왁스층에 안정적으로 부착되어 작물체에 고르게 분포되며, 약효가 오랫동안 지속됩니다.

• 내성 병원균에 대한 우수한 효과

다양한 작용 경로를 통해 작물체 내, 외부에서 동시에 작용하는 차별화된 작용 특성으로, 저항성 병원균에 대해서도 안정적인 방제효과를 기대할 수 있습니다.

• 칼슘 대사 증진 효과

고추 살포 시 부수효과로 수분 스트레스를 완화하여 칼슘 대사 촉진에 도움을 줍니다.



「수비탄」 액상수화제 작용기작



다양한 작용 경로로
작물체 내·외부에서 동시에 작용하여
안정적인 방제 효과를 나타냄

미토콘드리아 호흡 저해 작용 (Qoi)

병원균의 포자 형성·확산을 억제하고,
포자 발아와 초기 감염 단계를
효과적으로 차단

잎 표면의 왁스층에 강하게 결합

지질 친화성이 높아 잎 표면의
왁스층에 강하게 결합하고,
약제를 빠르게 흡수

뛰어난 침투이행성 및 확산 효과

약제가 작물체 내부로 침투·이행하고
일부는 기체 상태로 확산되어
표면으로 재분배

• 우수한 예방 효과

• 우수한 내우성
• 긴 약효 지속기간

• 살포되지 않은
주변 부위까지 보호



www.hescience.co.kr

H (주)한일사이언스

☎ 고객센터전화 1661-4166

• 안전사용기준을 잘 지켜 우수농산물을 생산합니다. • 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오. • 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.
• 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오. • 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

비 오기 전 준비, 우기 중에도 걱정없는 병해 방어!

수비탄

액상수화제



전체 등록 사항 확인 ▶

※ 기타 자세한 등록사항은 「농촌진흥청 농약안전정보시스템」에서 확인 가능합니다.

총 76작물 28대상 등록

발작물 (58개 작물) : 가지, 고구마, 고추(단고추류), 마늘, 무, 배추, 부추, 상추(양상추), 수박(복수박), 생강, 양배추, 인삼, 오이, 콩 등
과수작물 (18개 작물) : 감(단감), 감귤, 무화과, 복숭아, 사과, 살구, 석류, 오미자, 유자, 포도 등

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
가지	갈색무늬병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 3일전	3회 이내	
감(단감)	둥근무늬낙엽병			수확 21일전	4회 이내	
감귤	검은점무늬병		6.7mℓ	수확 30일전	3회 이내	
갯	뿌리혹병	정식 당일 관주처리	8mℓ(1ℓ/㎡)	파종(정식)기	1회 이내	
갯기름나물(방풍)	흰가루병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 7일전	3회 이내	
겨자채						
고구마	덩굴썩김병	정식 시 관주처리	8mℓ(1ℓ/㎡)	정식기	1회 이내	
고들빼기	흰가루병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 7일전	3회 이내	
고려엉겅퀴(곤드레나물)				수확 3일전		
고추(단고추류)	탄저병			수확 7일전	1회 이내	
고추(잎)	갈색점무늬병					
곤달비	흰가루병					3회 이내
공심채	점무늬병					
구기자	흰가루병					
근대	잿빛곰팡이병					
	탄저병					
마늘	잎마름병					수확 21일전
무						
배추	뿌리혹병	정식 당일 관주처리	8mℓ (150mℓ/주)	정식당일	1회 이내	
복숭아	잿빛무늬병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	3회 이내	
부추	잎마름병			발생초기	—	
	흑색썩음균핵병					
붉은꽃인동덩굴	흰가루병			수확 7일전	2회 이내	
비트	잿빛곰팡이병			수확 21일전	5회 이내	
뽕나무(잎)	균핵병	꽃이 피기 5일전 및 꽃이 진 후부터 경엽처리		수확 14일전	3회 이내	
	눈마름병	발병 초부터 경엽처리		수확 5일전		
사과	탄저병			수확 7일전	2회 이내	
살구	잿빛무늬병			수확 14일전	3회 이내	
상추(양상추)	갈색점무늬병			수확 7일전		
	흰가루병			수확 14일전	3회 이내	
생강	잎집무늬마름병	착과기부터 경엽처리	5mℓ	수확 7일전	2회 이내	
석류	열매썩음병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	3회 이내	
	탄저병					
수박(복수박)	덩굴마름병	정식기 관주처리	8mℓ(1ℓ/㎡)	수확 7일전	4회 이내	
양배추	뿌리혹병	정식기 관주처리	8mℓ(1ℓ/㎡)	정식기	1회 이내	
오이	흰가루병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 2일전	3회 이내	
참깨				수확 7일전		
청경채	뿌리혹병	정식기 관주처리	8mℓ(1ℓ/㎡)	파종·정식기	1회 이내	
콩	미이라병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	3회 이내	
포도	갈색무늬병			수확 21일전	4회 이내	